



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPrensivo STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 - Codice Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it -

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

Circolare n. 43

Ai docenti
Alle famiglie
Al personale Ata
I.C. "Giovanni Paolo II"

Oggetto: Pediculosi. Indicazioni operative.

Come di consueto, con l'approssimarsi della stagione fredda, si rammentano alcune norme generali:

1. **Pediculosi del capo:** la pediculosi è un'infestazione molto comune provocata dai pidocchi (*Pediculus capitis*); non c'è una correlazione stretta tra l'igiene personale, lo stato di pulizia degli ambienti casalinghi e la diffusione dei parassiti. Infatti, la trasmissione avviene per contatto diretto con persone già infestate oppure attraverso lo scambio di indumenti o effetti personali, come cuscini, cappelli, scarpe o pettini. I pidocchi, al di fuori del corpo umano, non possono vivere a lungo. Ogni disinfestazione di tipo ambientale è da considerarsi inutile.
2. **Diagnosi:** Un'accurata ispezione del cuoio capelluto è sufficiente per scoprire l'infestazione. **Prevenzione e gestione della malattia:** in genere la prevenzione della pediculosi viene fatta utilizzando corrette pratiche igieniche, suggerendo di evitare la condivisione di pettini, spazzole, cappelli, scarpe e indumenti. Se l'infezione viene accertata, è necessario ricorrere a prodotti insetticidi. L'ASL consiglia ai genitori delle classi dove dovessero essere segnalati casi di pediculosi di effettuare contemporaneamente il trattamento ai figli, per una maggiore efficacia dello stesso. In commercio esistono numerosi prodotti come polveri aspergibili, shampoo, lozioni o spray. Il pettine a denti fitti è un mezzo indispensabile per eliminare le uova e i pidocchi uccisi dal trattamento. E' necessaria una seconda applicazione del prodotto prescelto 7-10 giorni dopo la prima, per uccidere i pidocchi nati dalle uova schiuse dopo il primo trattamento. Consultare il medico o il farmacista per decidere il prodotto più idoneo e definire la posologia e le modalità di utilizzo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rita Troiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993